

ZAVÁDĚNÍ DLOUHODOBÝCH PERIFERNÍCH VSTUPŮ – PICC, MIDLINE, MINIMIDLINE EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY


Zavádíme vstupy pro dospělé pacienty naší nemocnice, ale i pro pacienty z jiných zdravotnických zařízení, nebo v domácím ošetřování. Všechny žilní vstupy jsou zaváděny pod ultrazvukovou navigací.

Na našem pracovišti se o Vás komplexně postaráme v oblasti cévního vstupu- zavedení, péče a edukace.

ZAJIŠŤUJEME


01

Zavádění Midline, Minimidline



02

Zavádění PICC



03

Zavádění kanyl do portu, proplachy portu



Zajištění žilních vstupů u
pacientů s obtížným
žilním přístupem

Odborný tým zajišťuje
péči a převazy u
hospitalizovaných i
ambulantních pacientů

KONTAKTUJTE NÁS

+420 731 154 850

hana.balvinova@nmskb.cz

www.nmskb.cz

Ordinační doba:
pondělí - pátek 8:00 - 14:00



MIDLINE A MINIMIDLINE KATÉTR

Střednědobý periferní žilní vstup

Co to je: Ohebná hadička v hluboké žíle na paži, která nezasahuje do centrálního oběhu.

Doba zavedení: Slouží na 1 týden až 3 měsíce.

Využití: Vhodný pro podávání běžných léků, antibiotik a pro hydrataci. Nevhodný pro chemoterapii.

PICC KATÉTR

Periferně zavedený centrální žilní katétr

Co to je: Dlouhá, ohebná hadička zavedená do žíly na paži, která směřuje až k srdci.

Doba zavedení: Vhodný pro léčbu delší než 14 dní (týdny, měsíce, až 1 rok).

Využití: Ideální pro agresivní léky, chemoterapii, umělou výživu či odběry krve.

ŽILNÍ PORT

(Implantabilní venózní port)

Podkožní systém pro dlouhodobou léčbu

Co to je: Malá komůrka kompletně skrytá pod kůží na hrudníku spojená s hlavní žílou.

Doba zavedení: V těle může bezpečně zůstat po dobu několika let.

Využití: Proplachuje se speciální Huberovou jehlou jen 1x za 4 až 8 týdnů, pokud se nepoužívá. Umožňuje volný pohyb, sprchování i plavání.

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY PACIENTŮ

- **Omezuje mě to v běžném životě?** S oběma katétry lze normálně fungovat, pracovat i sportovat. Je však nutné chránit místo vpichu před namočením, např. pomocí krytů na ruku při sprchování.
- **Je zavádění bolestivé?** Zákrok probíhá v lokální anestezii (z necitlivění) a trvá cca 30 minut, pacient tedy necítí bolest.
- **Jak se o vstup stará?** Místo vpichu vyžaduje sterilní převaz a kontrolu 1x týdně. Katétry se musí pravidelně proplachovat fyziologickým roztokem (metoda start-stop), aby se předešlo ucpání.
- **Kdo provádí péči?** Běžné převazy dělá ambulantní sestra nebo praktický lékař. V případě komplikací (zarudnutí, bolest) fungují specializované Ambulance pro dlouhodobé žilní vstupy napříč ČR.
- **Jaké jsou možné komplikace?** Mezi nejčastější rizika patří infekce v místě vpichu, trombóza (ucpání žíly sraženinou) nebo náhodné vytažení katétru.



<https://miamihealth.org/-/media/sylvester-comprehensive-cancer-center/pdf/portacath-pamphlet.ashx>
https://www.medplus.cz/jehla-huberova-polyperf-20g-s-kridelky-15-mm-prodluzovaci-hadicka-bez-fitalu-25-cm-luer-lock-10-ks/?gad_source=1&gad_campaignid=17190865106&gclid=EAIaIQobChMI8ruL-PONIQMVDJCDBx3M5hstEAOYAIABEgJYdvd_BwE

HYGIENA S KATÉTREM



Koupání ve vaně: je možné pouze v případě, že ruku s katétrech necháte položenou na okraji vany a nikdy ji neponoříte do vody.



Sprchování: je nejvhodnější volbou, ale ruka musí být bezpečně chráněna. Proud vody nesmí být přímo na katétr.



Plavání a saunování jsou po celou dobu zavedení katétru zakázány.

